



# کپاس کی فوٹس

## سی آئی ایم - 608 کی کاشت کے لئے سفارشات



سنبل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ملتان

پاکستان سنبل کاٹن کمیٹی، ملتان

وزارت تکنال امنڈری، حکومت پاکستان اسلام آباد

جراری بڑوہ

جائے جب وہ اپنی زندگی کی پہلی یادوں سی نرم و ناک حالت میں ہو۔ پرے کے بعد اگر بارش آجائے تو فصل کا معائنہ (پیٹ سکا و ٹنک) کریں۔ اگر زہرا شاہ بارش کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو تو ملاتا خیر دوبارہ پرے کریں۔

### کاشن لیف کرل و انرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر

- ☆ کپاس کی صرف منظور شدہ اقسام کا شست کریں۔
- ☆ کپاس کی کاشت مقرر و وقت نے پہلے ہرگز نہ کریں۔
- ☆ غیر علی بائی کاٹن ہرگز کا شست نہ کریں، یہ انرس پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔
- ☆ رس چونے والے کیڑے خصوصاً سفید کمبوی کے مدار کیلئے بچ کو سرایت پذیر زہرا کا کاشت کریں اور اسکے بعد سفید کمبوی کا بر وقت مدار کریں۔
- ☆ و انرس کے بیڑا بان پودے تلف کر دیں۔
- ☆ چھدر رائی کرتے وقت و انرس سے مٹاڑہ پودے نکال دیں۔
- ☆ باغات میں اور رائکے نزدیک کپاس کی کاشت سے اختاب کیا جائے۔
- ☆ کپاس کی فصل کو شروع ہی سے بڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں۔

مزید معلومات کیلئے

### ڈاکٹر یکٹر سنبل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ

پرانا شجاع آباد روڈ، ملتان سے رابطہ کریں

فون: 061-9200340-41 | نیکس: 061-9200342 | E-mail: ccri.multan@yahoo.com | Website: www.ccri.org.pk

PAK-US Cotton Productivity  
Enhancement Project (ID-1198-2)

PUBLICATION NO. 71

2015

پودے آپس میں نہ مل جائیں اور آخری گودوں کرتے وقت رجسے پودوں کے سامنے چڑھاویں۔ جن علاقوں میں اسٹ سٹ زیادہ ہو وہاں بولائی سے قبل اس جڑی بولنی کے تدارک کے لئے مناسب زہرا کا پرے کریں۔

### نتصان دہ کیزوں سے بچاؤ

رس پوشنے والے کیڑوں کے تدارک اوپھل کی اچھی بروٹری کے لئے جائیں کے وقت بچ کو زہرا کریں۔ اگر بچ کو دوائی نہ لگائی گئی ہو تو رس چونے والے کیڑوں کی تعداد کا جائزہ لیتے کیلئے فصل کا معائنہ (پیٹ سکا و ٹنک) باقاعدگی سے کرتے رہیں اور جب ان کی تعداد مقرر نہ تنصان کی معائی حد تک بچ جائے تو پرے کریں۔ پہلے پرے میں ایسی زہرا کا استعمال کریں جو نتصان دہ کیڑوں کے تدارک کے سامنے سامنے کسان دوست کیڑوں کے لئے بھی بخوبی ہو۔

کپاس کے نتصان دہ کیڑوں کی معائی حد کا چارٹ

کیڑے کا نام	معائی نتصان کی حد
قرچیں	8 تا 10 بالائی پچھنی پچھے
سینے تیلا	ایک بالائی پچھنی پچھے یادوں ملائک پچھنی پچھے
سینید کھیں	پانچ بالائی پیارے پیچھے یادوں ملائک پانچھنی پچھے
ست تیلا	اوپر کی شاخوں میں واضح نتصان ظاہر ہونے پر
جوکیں	پتوں پر نتصان ظاہر ہونے پر

### پہل کی سندھیاں

چکنی سندھی، امریکن سندھی اور گلابی سندھی کے غاف زہرا پاشی کریں۔ لٹکری سندھی فصل کے جن ٹکڑوں پر جملہ آب و ہوا پرے کریں۔ نتصان دہ کیڑوں کے تدارک کے لئے زہرا کا بچ تھاب، بچ مقدار، اچھی پرے میں اور ہالوکون نو زل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پرے کے لئے صاف شفاف پانی استعمال کریں۔

پرے بچ یا شام کے وقت کریں۔ پرے کرتے وقت زہرا پوڈے کے ہر حصے پر

چکنی چاہئے اور کوشک کی جائے کہ پرے نتصان دہ کیڑوں کے خلاف اس وقت کی

## کپاس کی قسم سی آئی ایم - 608 کی کاشت کے لئے سفارشات

یہ قسم پاکستان منفرل کائٹن سکھی (PCCC) کے تحقیقاتی ادارہ منفرل کائٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ملتان نے تیار کی ہے اور عام کاشت کے لئے 2013ء میں مظہر کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی اور واحد قسم ہے جو میرین کپاس اور افریقان جنگلی کپاس کے اختلاط سے تیار کی گئی ہے اس میں اورکس کے خلاف قوت مدافعت بدروج اتم موجود ہے اس کے پودے کا تدریجی اندازہ اور سردار شاخوں کا حال ہے۔ اس کے پیچے بزرگ میں اور بڑے طرح ہلائیں یہ عمل کرتے واقع کا پاؤ کرنے کیلئے اچھی طرح پانی سے صاف چک جائے تو نیاب سے بچ کو پاؤ کرنے کیلئے اچھی طرح پانی سے صاف کریں اور دھلے ہوئے بچ کو پوانی سے بھرے ہوئے شب میں ڈالیں۔ تیرنے والے بچ کو علیحدہ کر دیں اور بچ میختہ والے بچ تو فرش پر ڈھونپ میں پیٹکی تہبہ کی صورت میں بھکیر کر دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچ کو بور یوں میں ڈالتے وقت نئی نہ ہوئے یہ بیخ خراب ہو جائے گا۔ بچ کو حکمر راست توسعے کے عمل سے مشوہد کر کے بوانی سے پہلے رس چوستے والے انتشار دہ کیڑوں کے خلاف زہر لکائیں جس سے فصل کی بڑھوڑی اور صحت اچھی رہتی ہے۔

### آپاشی

رہنمی میں بھل کی بھل کی حالت اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے عام روایتیہ سے کاشت کی ہوئی بھل کو پہلا پانی 30-40 دن کے اندر بوانی کے بعد کریں اور اس کے بعد آپاشی بھل اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 دن کے وقفہ سے کریں۔ پہلے یوں پر کاشت کی اگر بھل کو بوانی کے بعد 4-5 دن کے وقفہ سے پہلا پانی لگا کیں تاکہ جہاں پہلے نہیں پہنچی وہاں بھی پہنچ جائے جو اس کے بعد زمین میں بھی، فصل کی حالت اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے 8-10 دن کے وقفہ سے آپاشی کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ فصل کی بچپن پر غیدہ پھول نظر نہ آئیں جو فصل کو پانی کی کی کی کی کی کاشن دی کرتے ہیں۔ بلکہ فصل کی بچپن پر غیدہ پھولوں کی وجہے ڈوڈیاں نظر آئیں۔ آپاشی اتنی مقدار میں کریں کہ کھیت اس کو 24 سے 36 گھنٹے میں جذب کر لے۔ آپاشی بھر کے آخری یا آن توبر کے پہلے ہفتہ میں بندر ہوئیں یا جب فصل کے 60 فیصد تینڈے کے پک کر کل جائیں تو اس وقت آخری آپاشی کی جائے۔

### کھاد ویں کا استعمال

کپاس کی زیادہ بیداری اور حاصل کرنے کیلئے کھادوں کا مناسب اور متوازن استعمال پوکے کو زمین سے متوازن خوارک لینے کو یقینی ہاتا ہے۔ کھاد کی صحیح مقدار کا تھیں

اور اس سے بہتر افادیت حاصل کرنے کیلئے زمین کا تجویز کرایا جائے اور اسی کی بنیاد پر کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ زمین تجویز کیلئے گورنمنٹ نے ہر ضلع میں لیبارٹریاں قائم کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی جو اسے آپاں کھبیت کی میں کا تجویز ہے کر اسکیں تو ذیل میں دیئے گئے گھوارہ کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں۔

مقدار کلوگرام فی ایکڑ		وقت
ناکشہ و جن	فاسفورس	
23**	-	بوت ہجاتی
-	11	پہلے پانی پر
-	23*	دوسرے پانی پر
-	23*	بھر پور پھولوں آنے پر
-	23*	دوبارہ بھر پور پھولوں آنے پر

\* 23 کلوگرام ناٹریٹ نیٹریجن = ایک بوری بوری  
\*\* 23 کلوگرام فاسفورس = ایک بوری بوری بوری

نوٹ: کپاس کی اگلتی کاشت کی صورت میں یہ رہا کہ استعمال بوقت ضرورت بڑھا جائیں گے۔

### چدداری

قطاروں میں پودوں کا آپس کا درمیانی فاصلہ چدداری کے ذریعے مناسب وقت پر رکھنا بہت نیت ضروری ہے، تاکہ پوے جگد کی منابع سے بڑھوڑی کریں۔ چدداری کرتے وقت کندرہ اور بیماری سے متاثر پودوں کو کوٹالا جائے۔ چدداری خلک گوڑی کے بعد اور پہلے پانی سے پہلے ایک ہنی فوسفات میں کمل کی جائے۔

### گوڑی اور ہڑی بیٹھوں کی تلفی

فصل کی گوڑی زمین میں پانی جذب کرنے اور وہ کو دریتک رکھنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ گوڑی کے عمل سے زمین میں ہوا کا گزر ہوتا ہے جس سے پوے کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ گوڑی سے جڑی بیٹھوں کی تلفی بھی ہوتی ہے۔ پہلے پانی سے تمغ و مخک گوڑیاں کریں۔ وہ جڑی بیٹھوں جو گوڑی کی زد میں نہ آئیں ان کو ہاتھوں سے ضرور ختم کر دیں۔ ہر آپاشی اور باڑش کے بعد زمین و تر آنے پر گوڑی کریں۔ گوڑی کے عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک

زمین کا انتظام	بیج، از رخیز میں
وقت کاشت	کم پہلے ۳۰ گھنٹے
قطعہ ویں کا درمیانی فاصلہ	۱۳۰ گھنٹے
پودوں کا درمیانی فاصلہ	۹۱۲ گھنٹے

### بیج اور اسکی تیاری

کپاس کا تقدم ایشیانی شدہ بیج بخا سینے کا رپورٹین یا باعتماد پر ایکیویٹ سینے کمپنیوں سے ہی خریدا جائے۔ ہر اترے ہوئے بیج کی فنی ایکنڈا مقدار کا خصائر بیج کے گاڑ کی فیصد صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اس کا تین یا تینی میں بند جو ڈیزل شرح اگاڑ کے مطابق کریں۔

شرح کلوگرام فی ایکڑ	فیصد اگاڑ
6	75
8	60
10	50